



Eficacia ante todo.

CONDROVET®

Polvo comestible.

VENTAJAS	BENEFICIOS
Glucosamina, Condroitin y Metilsulfonilmetano, como ingredientes activos.	Protege la degradación del cartílago a través de la inhibición de las citoquinas y metaloproteasas.
La Glucosamina	Estimula a los condrocitos aumentando la síntesis de colágeno y proteoglicanos. Incrementa la síntesis endógena de ácido hialurónico.
Glucosamina vehiculizada en sulfato.	Garantiza la efectividad y eficacia de CONDROVET® . La glucosamina, se puede vehiculizar en sulfato, n-acetil y clorhidrato, siendo esta última la más utilizada por otros productos debido a su costo menor. Cuando se toman estos suplementos los efectos que se producen siempre serán distintos. La mayor parte de la investigación científica, basado en la evidencia ha sido hecha sobre el <u>sulfato</u> .
Contiene Metilsulfonilmetano	Interviene en la síntesis de Condroitin sulfato a partir de los AA azufrados (Metionina, Cistina y Cisteina). Acción antiinflamatoria y analgésica. Favorece la regeneración del cartílago. Mejora el flujo sanguíneo hacia las extremidades.
La fórmula de mayor concentración de glucosamina, condroitin y MSM.	Constituye la fórmula más completa, rápida y eficaz para el tratamiento de afecciones articulares. Formulación equilibrada avalada por información científica y ensayos clínicos realizados. Permite establecer terapia preventiva y terapia clínica.



Eficacia ante todo.

Contiene Maltodrextina, como excipiente.	Ingrediente natural. Ofrece como mínimo 90% de fibra soluble dietaria, que ayuda a retardar la digestión y la rapidez con que los nutrientes se absorben en el intestino y ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Regula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon. Provee energía de larga duración.
Excelente palatabilidad	Los componentes de CONDROVET, lo hace altamente palatable, sin alterar la naturaleza de sabor del alimento diario de la mascota. Sin saborizantes artificiales.
Fácil administración	Para ser mezclado con el alimento, en la primera comida de la mañana De no ser aceptado en el alimento, puede ser fácilmente mezclado en agua para administración directa.
Contiene cuchara dosificadora	Permite dosificar como preventivo o como terapia clínica en caso de Enfermedad articular degenerativa.
Tarro de 300 gramos	Cantidad suficiente que garantiza el inicio de tratamiento como mínimo de 60 días, que garantiza los resultados.