



Eficacia ante todo.

FLATIVET®

Emulsión oral

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de **FLATIVET®** Solución contienen:

Dimetil-Polisiloxano USP 30 g.

DESCRIPCIÓN:

FLATIVET® es una emulsión oral con acción antiespumante y antiflatulento, reduciendo la tensión superficial de la burbuja gaseosa permitiendo la expulsión de los gases, Indicado para el tratamiento de timpanismo o meteorismo en bovinos, equinos, ovinos, caprinos y en perros.

INFORMACIÓN QUÍMICA:

El dimetil-polisiloxano es aceite de siliconas, que consiste en una mezcla de polímeros lineales de siloxano completamente metilados con el fin de la cadena bloqueada con unidades trimetilsiloxi. Cuando está mezclada con dióxido de silicio se lo conoce como simeticona Líquido claro a incoloro. La viscosidad aumenta con la polimerización. Inmiscible con agua o alcohol. Miscible con cloroformo o éter. Es una mezcla de polímeros sintéticos de xilosano con dióxido de silicona. Contiene menos que el 90.5% y no más del 99% de poldimetilxilosano y no menos que 4.0% y no más del 7.0% de dióxido de silicona.

El dimetil – polisiloxano no se absorbe a nivel gastrointestinal, por tanto toda su acción es localmente, siendo eliminada por las heces.

INDICACIONES:

FLATIVET® está especialmente indicado en los procesos de timpanismo o meteorismo, principalmente debidos a la ingestión de forraje verde recalentado, muy tierno o fermentado.



Eficacia ante todo.

Gracias a su acción lubricante, en caninos y felinos es útil para prevenir y tratar problemas de gases como flatulencia y timpanismo canino; de esta forma previene la presentación de torsiones y vólvulos gástricos.

Favorece el vaciado del tracto gastrointestinal como preparación para una cirugía en cavidad abdominal.

En casos de obstrucción por impactación de la materia fecal en el intestino, favorece el tránsito intestinal (por lubricación y no por efecto laxante).

En gastroenteritis severas actúa como lubricante del lumen intestinal, disminuyendo la fricción y el desprendimiento de la mucosa, creando una película que a su vez disminuye la absorción de las enterotoxinas bacterianas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, previa dilución en 250 mL de agua administrar:

Bovinos y equinos: 40 mL / 100 Kg de peso

Ovinos y caprinos: 20 mL / 50 Kg de peso

Caninos: 5-10 mL según tamaño, sin diluir

Se recomienda suministrar dos tomas diarias, pero en todos los casos, impera el criterio del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:

No tiene tiempo de retiro en carne ni en leche, por lo que se puede administrar en cualquier etapa de la producción.

PRESENTACIONES:

Frasco por 120 mL

Licencia Registro ICA

2224 DV.